

XXXIV EXAME
PARA OBTENÇÃO DO
TÍTULO DE ESPECIALISTA
EM DERMATOLOGIA
2001

**PROVA TEÓRICA
QUESTÕES E RESPOSTAS**



**SOCIEDADE
BRASILEIRA DE
DERMATOLOGIA**

A F I L I A D A À A M B

XXXIV EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA - 2001

PROVA TEÓRICA - QUESTÕES E RESPOSTAS

A01 – Considera-se paniculite septal:

b) eritema nodoso

A02 - A síndrome de Churg-Strauss consiste de:

d) vasculite sistêmica, envolvimento de dois ou mais órgãos extrapulmonares, asma e hipereosinofilia

A03 - A destruição da elastina e do colágeno na parede dos vasos nas vasculites é atribuída a uma das proteases produzidas por:

a) neutrófilos

A04 - Qual das doenças abaixo se caracteriza por apresentar eritema nodoso, uveíte e aftas:

d) síndrome de Behçet

A05 - A Síndrome de Löfgren pode ocorrer na sarcoidose e caracteriza-se por:

d) eritema nodoso e aumento bilateral dos linfonodos hilares

A06 – Assinale a doença em que se observa elastofagocitose:

b) granuloma actínico

A07 - Em relação à doença de Fox-Fordyce é incorreto afirmar que:

a) piora na gravidez

A08 - Histologicamente, a dermatite seborréica no paciente infectado pelo HIV, tende a mostrar:

e) maior envolvimento folicular e mais plasmócitos

A09 - Dentre os fatores desencadeadores da psoríase pustulosa generalizada, o mais importante é:

d) retirada abrupta de corticóide sistêmico

XXXIV EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA - 2001

PROVA TEÓRICA - QUESTÕES E RESPOSTAS

A10 - Não é causa de coagulação intravascular disseminada (síndrome da púrpura fulminante):

b) mieloma múltiplo

G01 - Lesões purpúricas por perda de apoio tecidual não ocorrem em qual das doenças abaixo:

b) púrpura neoplásica

G02 - Apresenta herança autossômica dominante:

a) cisto triquilemal

G03 - Histologicamente são comuns a todos os tipos de queratose seborréica:

e) hiperqueratose, acantose e papilomatose

G04 - O nevo de Reed é considerado variante de:

b) nevo de Spitz

G05 - Caracteriza-se por apresentar nódulos sensíveis ou dolorosos:

b) espiradenoma écrino

G06 - A vasculite cutânea em que têm sido relatado vários casos com infecção pelo HIV é:

e) Erythema elevatum diutinum

G07 - Trauma não se encontra na patogênese da:

d) paniculite histiocítica citofágica

G08 - Dentre as vasculites a que se associa mais freqüentemente a c-ANCA é:

a) síndrome de Wegener

G09 - A bromidrose na pele humana não é determinada por:

c) secreção écrina

XXXIV EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA - 2001

PROVA TEÓRICA - QUESTÕES E RESPOSTAS

G10 – Em relação à etiologia e à patogênese da psoríase é incorreto afirmar que:

d) tanto a ciclosporina como a AIDS inibem a função da célula T-auxiliar, motivo da melhora da psoríase em ambas as condições

G11 – Quando se compara a pitiríase rubra pilar (PRP) e a psoríase é incorreto afirmar que:

c) a resposta ao metotrexato é boa em ambas

G12 – A púrpura pós-transfusão ocorre por:

a) diminuição no tempo de sobrevivência das plaquetas

M01 - Na epidermodisplasia verruciforme (Lutz-Lewandowski) há disseminação de lesões do tipo:

c) plano

M02 - Quais das drogas abaixo aumentam a síntese da melanina?

a) ciclofosfamida, AZT

M03 - Paciente masculino 52 anos apresentou na face, couro cabeludo e tronco lesões bolhosas, flácidas cujo quadro clínico é similar ao pêfigo foliáceo. Na anamnese havia história do uso de drogas. Qual dentre as abaixo citadas provocou esta manifestação?

e) piroxicam

M04 - Dentre as manifestações cutâneas causadas pela heroína encontramos:

e) lesões pigmentadas principalmente do tipo eritema pigmentar fixo na língua

M05 - A reação de Jarisch-Herxheimer é uma resultante da:

d) destruição de grande número de microorganismos por uma droga

M06 - A principal radiação indutora de fotossensibilidade é:

b) ultravioleta A

XXXIV EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA - 2001

PROVA TEÓRICA - QUESTÕES E RESPOSTAS

M07 - O quadro de actino-reticuloide é encontrado principalmente em homens idosos. Esta erupção se caracteriza por:

a) eritema, pápulas e placas liquenificadas que podem evoluir para eritrodermia

M08 - Dentre as manifestações cutâneas da doença de Lyme temos:

b) linfocitoma cutis

M09 - A botriomicose se caracteriza por:

c) tumoração vegetante e fistulosa com eliminação de pus

M10 - A doença de Paget extramamária tem como localização mais freqüente a:

a) região anogenital

M11 - O corno cutâneo é uma expressão clínica que se caracteriza pela produção exagerada de camada córnea; das afecções abaixo qual não possui esta característica?

d) carcinoma basocelular

R01 - Em relação ao carcinoma basocelular esclerosante podemos afirmar que:

c) não se ulcera

R02 - O epitelioma cuniculatum localiza-se na região:

c) plantar

R03 - O linfangiossarcoma na síndrome de Stewart-Trèves é consequência de:

c) um linfoedema pós-mastectomia radical com esvaziamento de linfonodos

R04 - A tricoptilose se caracteriza por:

a) cabelos frágeis e bifurcados

XXXIV EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA - 2001

PROVA TEÓRICA - QUESTÕES E RESPOSTAS

R05 - Em relação a alopecia areata podemos afirmar que:

a) quando ocorre a reponta os cabelos são no início geralmente brancos

R06 - O xantogranuloma juvenil é uma manifestação que:

a) surge em semanas ou meses após o nascimento e pode regredir espontaneamente em 1 ou 2 anos

R07 - A elaioconiose se manifesta clinicamente por:

b) pontos negros nos óstios foliculares principalmente nos quirodáticos e antebraços

R08 - A função principal da isotretinoína, ácido 13 cis retinóico, derivado do retinol deve-se a:

a) diminuir a sebogênese e normalizar a queratinização

R09 - O eczema herpético pode ser definido como:

d) uma manifestação herpética disseminada nos indivíduos portadores de dermatite atópica e doença de Darier

R10 - Em relação a fotoalergia podemos afirmar que:

c) há um período de incubação

J01 - As drogas que mais frequentemente desencadeiam porfiria cutânea tardia são:

a) barbitúricos, fenilhidrazida, estrogênios

J02 - Os desmossomas são estruturas que têm como função principal:

a) a adesão entre as células

J03 - A zona da membrana basal, do ponto de vista ultraestrutural, é formada dos componentes abaixo, com exceção de:

b) bainha de Huxley

XXXIV EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA - 2001

PROVA TEÓRICA - QUESTÕES E RESPOSTAS

J04 - Em relação às glândulas sebáceas podemos afirmar que:

- c) são independentes da estimulação nervosa

J05 - Os corpúsculos de Vater-Pacini estão relacionados especificamente com:

- d) sensibilidade à pressão

J06 - Qual das dermatoses abaixo não apresenta depósito de imunoglobulinas na zona da membrana basal?

- b) pênfigo foliáceo endêmico

J07 - Em relação à atrofia branca de Millian podemos afirmar que:

- b) representa uma vasculite hialinizante segmentar

J08 - Em relação à púrpura de Henoch-Schönlein, podemos afirmar que é:

- c) vasculite leucocitoclástica mediada por IgA

J09 - Quais das genodermatoses abaixo apresentam alterações ungueais?

- b) epidermolise bolhosa distrófica e síndrome de Jadassohn-Lewandowsky

J10 - No dermatografismo evidenciado na urticária física, quais componentes da tríplice reação de Lewis apresentam-se alterados?

- a) eritema reflexo e urtica

J11 - Em relação à imunologia da dermatite atópica podemos afirmar que:

- e) há aumento de células apresentadoras de antígenos, como as de Langerhans

F01 - A ictiose ligada ao sexo está relacionada a alteração de:

- b) arilsulfatase C e esteróide-sulfatase

F02 - A síndrome de Netherton é caracterizada por:

- a) ictiose linear circunflexa, tricolorrexis invaginata e atopia

XXXIV EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA - 2001

PROVA TEÓRICA - QUESTÕES E RESPOSTAS

F03 - A alteração na epidermolise bolhosa distrófica está relacionada com os genes que condicionam a formação de:

b) colágeno tipo VII

F04 - A síndrome de Sjögren-Larsson é caracterizada por:

b) ictiose, alteração no SNC, degeneração macular da retina

F05 - Em relação ao lúpus eritematoso cutâneo subagudo assinalar a afirmação incorreta:

c) o comprometimento renal é muito intenso

F06 - Os grupos musculares mais frequentemente acometidos na dermatomiosite são:

a) cintura escapular, cintura pélvica e porção proximal dos membros

F07 - Dos exames abaixo qual o menos específico para dermatomiosite?

a) biopsia da pele lesada

F08 - O kwashiorkor é uma doença decorrente de:

c) deficiência protéica e ingestão adequada calórica

F09 - O xantoma eruptivo está habitualmente relacionado com nível de:

a) triglicérides elevado e quilomicrons elevado

F10 - A imunodeficiência associada à acrodermatite enteropática é devida principalmente a:

d) hipoplasia tímica

T01 - No controle clínico-laboratorial dos doentes com paracoccidiodomicose em tratamento os exames mais importantes atualmente são:

a) a contra-immunoeletoforese e a imunodifusão

XXXIV EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA - 2001

PROVA TEÓRICA - QUESTÕES E RESPOSTAS

T02 - O escrofuloderma é a forma de tuberculose:

b) que raramente decorre de inoculação exógena do bacilo no tecido subcutâneo

T03 - Na sífilis congênita:

a) recomenda-se realizar o exame do LCR em todos os casos que se enquadrem na definição de caso;

T04 - A síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada caracteriza-se por:

b) uveíte, alterações psiconeurais e manchas acrômicas na face

T05 - Casos de ocronose exógena podem ser conseqüentes a:

c) hidroquinona, resorcina e fenol

T06 - A feohifomicose é:

d) caracteriza-se em geral por lesão cística ou simulando abscesso

T07 - Os eumicetomas:

b) podem ser ocasionados por fungos do gênero *Acremonium* e respondem de modo irregular aos tratamentos com imidazólicos

T08 - Entre os principais aspectos da hanseníase virchowiana temos:

d) lesões infiltradas, eritematosas, bordas mal delimitadas na maioria dos casos, com baciloscopia sempre positiva e boa resposta ao tratamento

T09 - Os antimoniais podem causar:

a) alterações cardíacas ou renais

P01 - Com relação à dermatite artefata:

e) diferentemente da escoriação neurótica, o paciente não admite para o médico qualquer papel na produção da lesão

XXXIV EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA - 2001

PROVA TEÓRICA - QUESTÕES E RESPOSTAS

P02 - A porcentagem aproximada de metástase nos linfonodos em uma mulher de 40 anos com melanoma na panturrilha, índice de Breslow = 0,60 mm e nível de Clark II, tratada cirurgicamente é:

b) menor que 8%

P03 - Mulher, 65 anos, com carcinoma basocelular recidivante esclerodermiforme, de 3 cm localizado na região periorbicular, o método terapêutico de eleição é:

b) cirurgia micrográfica de Mohs

P04 - A cardiotoxicidade é mais freqüentemente causada por qual dos agentes utilizados nos "peelings"?

d) fenol

P05 - As manifestações cutâneas da leucodermia ocupacional ocorrem com maior freqüência pelo contato com:

a) butil-fenol - p- terciário

P06 - Cloracne por hidrocarboneto clorado diferencia-se do acne vulgar por:

c) formar cistos amarelados não supurativos e não inflamatórios persistentes

P07 - A leucoplasia pilosa oral que ocorre em paciente com AIDS é atribuída a:

a) vírus Epstein - Barr

P08 - Segundo os estudos clássicos da história natural da sífilis, que porcentagem aproximada de doentes não tratados evoluirão para sífilis cardiovascular?

d) 10%

P09 - A Malassezia furfur, agente etiológico da pitiríase versicolor, causa hipocromia cutânea por produzir:

a) ácido azelaico que inibe o efeito da enzima tirosinase

PROVA TEÓRICA - QUESTÕES E RESPOSTAS

P10 – A acantose nigricante maligna está mais freqüentemente associada com:

a) adenocarcinoma gástrico

C01 - Câncer de mama ocorre com freqüência aproximada de 30% em mulheres com síndrome de:

c) Cowden

C02 - Paciente submetido a nutrição parenteral por período prolongado passou a apresentar diarréia, alopecia e erupção periorifical. A causa mais provável da erupção é deficiência de:

a) zinco

C03 - O epítipo antigênico do desmossomo reconhecido pelo soro de doentes com fogo selvagem é idêntico ao do pênfigo:

a) foliáceo clássico de Cazenave

C04 - Neurite periférica é mais freqüentemente associada com o uso de:

c) talidomida

C05 - Hiperpotassemia é freqüentemente observada com o uso de:

a) espironolactona

C06 - Criança de 2 meses apresenta hemangioma obstruindo fossa nasal esquerda e olho esquerdo. A mãe informa que a lesão estava presente desde o nascimento e apresenta crescimento muito rápido. Qual é o tratamento de eleição?

e) corticóide sistêmico

C07 - A terapêutica mais eficaz para os casos graves do distúrbio psiquiátrico "ilusão parasitária (delírio de parasitose)" é a administração por via oral de:

b) pimozide

XXXIV EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA - 2001

PROVA TEÓRICA - QUESTÕES E RESPOSTAS

C08 – Das substâncias abaixo, qual é a mais freqüentemente causadora de dermatite de contato alérgica nos dentistas?

e) resinas acrílicas

C09 - Em relação à dermatite de contato alérgica do cimento, causada por hipersensibilidade ao cromo, todas as afirmações estão corretas, exceto:

c) o sal trivalente do cromo penetra mais facilmente na pele do que o sal hexavalente

S01 - Para os pacientes com hanseníase apresentando lesão única pode ser utilizado esquema terapêutico com dose única. Neste tratamento são empregadas as seguintes drogas:

d) ofloxacina, rifampicina e minociclina

S02 - Nos pacientes com hanseníase borderline-virchowiana e escrofuloderma será importante:

c) não modificar os esquemas terapêuticos das duas enfermidades; os tratamentos são realizados simultaneamente

S03 - Das doenças abaixo relacionadas, qual é indicativa da presença de AIDS (critério CDC modificado)?

b) criptococose extrapulmonar

S04 - No tratamento da tinea capitis, a droga de escolha é:

a) griseofulvina

S05 - Entre as principais drogas recomendadas pelo Ministério da Saúde para o tratamento de pacientes masculinos com corrimento uretral temos:

a) ofloxacina – 400 mg,
VO (dose única) + azitromicina – 500mg, VO (dose única);

S06 - De acordo com o Ministério da Saúde recomenda-se, para todos os pacientes com DST:

d) sorologia para HIV (ELISA) e VDRL

XXXIV EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA - 2001

PROVA TEÓRICA - QUESTÕES E RESPOSTAS

S07 - Atualmente, para os pacientes “borderline-borderline” recomenda-se o seguinte esquema terapêutico:

d) DDS – 100mg/dia + clofazimina – 50mg/dia + rifampicina – 600mg por mês + clofazimina – 300mg por mês, durante um ano;

S08 - Entre os principais aspectos da hanseníase indeterminada temos:

d) mancha (s) hipocrômica (s), com baciloscopia negativa e boa resposta ao tratamento paucibacilar (6 meses) quando houver 2 a 5 lesões



**SOCIEDADE
BRASILEIRA DE
DERMATOLOGIA**

A F I L I A D A À A M B

Sociedade Brasileira de Dermatologia
Av. Rio Branco nº 39, 18º andar
Caixa Postal 389
CEP 20090-003 Rio de Janeiro - RJ

Tel: (21) 2253-6747
diretoria@sbd.org.br